PERIS SAS
N° AGREMENT LR00035
DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

PERIS.FR

BULLETIN TECHNIQUE ET INFORMATIF PRECONISATION COLLECTIVE DE L'ÉQUIPE PERIS

AGROSUD

N°06
Juin 2019

MILDIOU

La pression maladie est très variable. On observe des taches sur feuilles dans plusieurs communes, la majorité d'entre elles sont non fructifiées. Des symptômes sur grappes ont également été trouvés sur la commune de Vias. Les fortes pluies du 17 et 18 mai ont engendrées des contaminations dans tous les secteurs. Il est justifié de maintenir la protection des parcelles avec les spécialités suivantes :
PROFILER à 3kg/ha ou **RESPLEND à 1l/ha** ou **AMPEXIO à 0.4l/ha** (avant floraison) et **0.5l/ha** (après floraison).

En agriculture biologique, il est possible d'utiliser : **HELIOCUIVRE à 1.5l/ha** ou **COPERNIICO HI BIO à 2.5kg/ha.**

OÏDIUM

Nos modèles indiquent un risque fort de sortie au stade nouaison surtout sur cépages sensibles comme le Chardonnay. La remontée rapide des températures est propice à un développement du pathogène. Il est conseillé : **LUNA XTEND à 0.2l/ha** ou **ROCCA à 0.5l/ha**
En agriculture biologique, vous disposez de **FLOSUL à 4l/ha** ou **THIOVIT JET à 8kg/ha** ou **COSAVET à 8kg/ha.**

Pour renforcer l'efficacité de votre traitement, vous pouvez ajouter : **ESSEN'CIEL à 0.8l/ha.**
Un poudrage en sortie de floraison s'avère très pertinent afin de limiter la pression maladie et aider à la chute des capuchons floraux. Pour ce faire, vous disposez de : **FLUIDOSOUFRE à 25kg/ha** ou **ILICIA à 15kg/ha.**

BLACK ROT

Nous avons relevé des symptômes de black rot sur feuilles avec présence de pycnides. Nous vous conseillons de choisir des spécialités ayant la double homologation, oïdium - black rot ou mildiou – black rot. En agriculture biologique, la solution la plus efficace est d'associer un soufre à un cuivre afin de limiter le développement de la maladie.

VERS DE GRAPPE

Nous constatons la présence de nombreux glomérules dans certains secteurs, notamment le grand Narbonnais ou le Biterrois. Il est primordial d'effectuer des contrôles afin d'évaluer la pression. Ceci est nécessaire afin d'anticiper au mieux la deuxième génération et d'intervenir si nécessaire.

FLAVESCENCE DORÉE

La date de la première intervention a été communiquée, elle doit avoir lieu entre le 1er et le 12 juin. Cette intervention est à renouveler 15 jours plus tard, vous pouvez utiliser : **KLARTAN à 0.2l/ha** ou **DECIS à 0.5l/ha**
En agriculture biologique, les trois traitements sont à effectuer à 10 jours d'intervalle à partir du 1er juin avec : **PYREVERT à 1.5l/ha**
Certaines communes bénéficient d'aménagement et sont concernées par 1 ou 2 traitements obligatoires. Se référer à la liste publiée sur le site de la DRAAF Occitanie.

NUTRITION DE LA VIGNE

A partir du stade nouaison, nous vous conseillons de maintenir son alimentation soit en irrigation fertilisante pour les parcelles équipées de goutte à goutte et de matériel d'incorporation des engrais, soit par voie foliaire. Les doses sont à adapter avec votre technicien PERIS
En irrigation fertilisante : **SOLUWATER 15.5.30** ou **KRYSTAFEED 20.5.20** ou **FERTIPLANT 15.10.30+Oligo-éléments** ou **SOLINURE 15.05.30 (acidifiant).**
Par voie foliaire : **NUTRIZ 2A à 2 L/Ha UAB** ou **ANTYS PMG à 5 L/Ha.**

Pour des interventions foliaires en situation de carences potassiques :
NUTRIKALI à 5 L/Ha UAB ou **AGROLEAF HIGHT K 15.10.31 à 3 Kg/Ha** ou **ANTYS K à 5 L/Ha.**

CÉRÉALES À PAILLE

Les moissons devraient commencer dès la fin juin.
Comme l'année dernière, la société PERIS va collecter sur deux sites, du blé dur, du blé tendre, de l'orge ainsi que des pois chiches durant la période estivale. Compte-tenu des problèmes de qualité rencontrés l'année dernière, nous vous proposerons un prix final après la collecte des grains.
De plus, les prix d'engrais pour l'alimentation de vos blés de 2020 sont au plus bas aux mois de mai-juin, vous pouvez par conséquent obtenir les meilleurs prix en déterminant vos besoins dès maintenant. **Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour obtenir davantage d'informations.**

POIS CHICHE

Actuellement, les vols d'héliothis sont à surveiller de près pour ne pas perdre de récolte. L'utilisation du **DELFIN à 1 kg par hectare** est suffisante pour limiter ce ravageur.

Ouverture des magasins PERIS le samedi
Vous pouvez désormais vous rendre dans vos magasins PERIS le samedi matin et ce jusqu'à la mi-juillet.

Retrouvez les adresses et horaires de vos magasins sur :
peris.fr / rubrique : nos magasins

METHODES ALTERNATIVES

MILDIOU / OÏDIUM / BLACK-ROT / BOTRYTIS : Effeuillages, Epamprage, Ebourgeonnage, Eclaircissage, Maitrise de la vigueur, Raisonnement lors de la plantation, Maitrise de l'enherbement, Drainage, Rognage, Pas de traitement. Spécifique Botrytis : Bacillus Subtillis. Spécifique Black-rot : Enlever et brûler les feuilles atteintes, enfouir les grappes tombées à terre lors des récoltes (mécaniques ou tri manuel) Modélisation, station météo, BSV, Observations de symptômes, flash technique, rémanence des produits.
ROUGEOT : Travailler le sol après la chute des feuilles, Eviter d'avoir une surface foliaire trop près du sol, Pas de traitement. Observations de symptômes Stade phénologique.
EXCORIOSE : Eliminer les rameaux touchés lors de la taille et les évacuer de la parcelle, Maitrise de la vigueur, Raisonnement lors de la plantation, Pas de traitement. Observations, comptage, stade phénologique
ESCA / BDA / EUTYPIOSE : Arrachage et brûlage des souches malades, limiter le nombre et l'importance des plaies de taille, recourir à des tailles tardives, Eliminer et/ou brûler les bois de plus de 2 ans, Brûler rapidement les tas de souches. Pas de traitement. Observations de symptômes.
ARAIGNEES ROUGES ET JAUNES, ACARIOSE ET ACARIENS, THRIPS, ERINOSE, MANGES-BOURGEONS, COCHENILLES, PYRALES ALTISES ET CIGARIERS, CICADELLES DES GRILLURES : Maintien de la faune auxiliaire (typhlodromes et Cecidomyies prédatrices) Limiter les zones humides et ombragées, Traitements éventuels à base de Bacillus Thuringiensis (cigarier), Pas de traitement. Observations, comptages
NECROSE BACTERIENNE : Nettoyage et désinfection des outils de travail (sécateurs, lames…) Tailler par temps sec et froid, précocement pour éviter les pleurs, Eliminer et brûler les sarments atteints, Récolter d'abord les vignes saines, Pas de traitement. Observations, Comptages
ENROULEMENT : Eliminer les populations de cochenilles, vectrices du virus, pas de traitement. Observations, comptages
CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE : Arrachage et brûlage des souches infectées, Pyrèthre naturel. Observations, comptages, arrêtés préfectoraux (flavescence)
VERS DE GRAPPE : Effeuillage, Bacillus Thuringiensis, confusion sexuelle, Maintien de la faune auxiliaire, Pas de traitement. Observations, comptages, modèles
DESHERBAGE : Entretien mécanique du cavaillon + inter-rangs ou désherbage thermique, Epamprage manuel ou mécanique. Observations, connaissance de la flore pour le choix de l'herbicide.

Mentions légales :

PROFILER Fournisseur: Bayer CropScience France N° A.M.M.: 2100181 Matières actives: Fluopicolide, Fosétyl-Aluminium Formulation: Granulé dispersableToxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H319, H410, P280, P501 Cible: Mildiou Dose: 3.0 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 24h DAR: 28j

RESPLEND Fournisseur: Basf Agro SAS N° A.M.M.: 2150387 Matières actives: Diméthomorphe, Amétoctradine Formulation: Suspension concentrée Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H302, H410, P264, P270, P273, P280, P301 + P312, P330, P391, P405, P501 Cible: Mildiou Dose: 1.0 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 35j Cible: Destruction des rejets Dose: 1.0 l/hl

AMPEXIO Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 2171119 Matières actives: Mandipropamide, Zoxamide Formulation: Granulé dispersable Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H317, H410, P102,P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P391, P501 Cible: Mildiou Dose: 0.5 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 20.0m DRE: 48h DAR: 21j

HELIOCUIVRE Fournisseur: Action Pin N° A.M.M.: 9900227 Matières actives: Cuivre de l'hydroxyde de cuivre Formulation: Suspension concentrée Toxicité: SGH05, SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H302, H315, H318, H410, P270, P273, P280, P301 + P312, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P310, P501 Cible: Mildiou Dose: 3.0 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 24h DAR: 21j

COPERNICO HI BIO Fournisseur: Protex France N° A.M.M.: 2090134 Matières actives: Cuivre de l'hydroxyde de cuivre Formulation: Granulé dispersable Toxicité: SGH05, SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H318, H332, H410, P102, P261, P270, P280, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P310, P391, P501 Cible: Mildiou Dose: 3.0 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 20.0m DRE: 24h DAR: 21j

LUNA XTEND Fournisseur: Bayer CropScience France N° A.M.M.: 2130152 Matières actives: Fluopyram, Trifloxystrobine Formulation: Suspension concentrée Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H302, H410, P280, P308 + P311, P501 Cible: Oïdium Dose: 0.2 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 14j

ROCCA Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 2130049 Matières actives: Cyflufénamid, Difénoconazole Formulation: Concentré dispersable Toxicité: SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H410, P102, P270, P273, P280, P391, P501 Cible: Oïdium Dose: 0.5 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 21j

FLOSUL Fournisseur: Vivagro N° A.M.M.: 2160818 Matières actives: Soufre Formulation: Suspension concentrée Toxicité: Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, P101, P102, P262, P270, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P391, P501 Cible: Oïdium Dose: 4.0 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 5j

THIOVIT JET MICROBILLES Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 2000018 Matières actives: Soufre pour pulvérisation (micronisé) Formulation: Granulé dispersable Toxicité: Phrases de risque: EUH 401, P102, P270, P280 Cible: Oïdium Dose: 12.5 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 3j.