

Bulletin d'informations Cryptoblabes Gnidiella

Edité le 09/08/2021

Cette pyrale est observée depuis plusieurs années dans notre vignoble. Elle est présente dans tous les secteurs, occasionnant localement des dégâts importants, constatés à partir du mois d'août. Cet insecte est très polyphage et a de nombreuses plantes hôtes dont la vigne.

Cryptoblabes est attirée par le sucre. Sa présence est privilégiée dans les parcelles contenant de la pourriture, des éclatements de baies dus à l'oïdium, des attaques d'eudémis et de cochenilles... Les pontes sont quasi-impossibles à observer. Les larves se protègent en réalisant un nid en cœur de grappe où plusieurs individus se développent. Les chenilles sont brunes avec des bandes de couleur marron sur les côtés.

Péris a développé, en parallèle de l'eudémis, un réseau de piégeage pour ce ravageur afin de suivre son évolution (courbes de vols pages suivantes).

Les dégâts peuvent être observables tardivement. Ce ravageur peut potentiellement détruire la récolte.




Source SLOPEZ PERIS



Source SLOPEZ PERIS

Il est primordial d'observer les parcelles qui ont été touchées l'an dernier ou deux ans auparavant, les parcelles avec un état sanitaire altéré et les parcelles où des prises de papillons sont importantes.


BITERROIS - 09/08/2021



COMMENTAIRES

Les prises de papillons sont faibles jusqu'à fin juin, cryptoblabes étant probablement sur d'autres plantes hôtes. A partir de début juillet, des prises de papillons sont observées avec parfois des effectifs importants.


BASSE VALLEE DE L'HERAULT 1 – 09/08/2021



COMMENTAIRES

Les prises de papillons sont faibles jusqu'à mi-juin, cryptoblabes étant probablement sur d'autres plantes hôtes. A partir de début juillet, des prises de papillons sont observées avec parfois des effectifs importants.


BASSE VALLEE DE L'HERAULT 2 – 09/08/2021



COMMENTAIRES

Les prises de papillons sont faibles jusqu'à fin juin, cryptoblabes étant probablement sur d'autres plantes hôtes. A partir de début juillet, des prises de papillons sont observées avec parfois des effectifs importants.


MOYENNE VALLEE DE L'HERAULT – 09/08/2021



COMMENTAIRES

Les prises de papillons sont faibles jusqu'à début juillet, cryptoblabes étant probablement sur d'autres plantes hôtes. A partir de mi-juillet, des prises de papillons sont observées avec parfois des effectifs importants.


GRAND NARBONNAIS – 09/08/2021



COMMENTAIRES

Les prises de papillons sont faibles jusqu'à début juillet, cryptoblabes étant probablement sur d'autres plantes hôtes. A partir de mi-juillet, des prises de papillons sont observées avec parfois des effectifs importants.

MINERVOIS – 09/08/2021



COMMENTAIRES

Peu de prises sont observées à ce jour dans les pièges.